

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

DLP - 3 - 7 - 69 950797

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE RENNES (Tél. 36-01-74)

(CALVADOS, COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MANCHE, MORBIHAN, ORNE)

Sous-Régisseur de Recettes de la D.D.A. — Protection des Végétaux. Route de Fougères, RENNES

C. C. P. RENNES 9404-94

ABONNEMENT ANNUEL

25 F

SUPPLEMENT N° 2 AU BULLETIN N° 105

30 JUIN 1969

## AVERTISSEMENTS

### POMMIER - POIRIER

CARPOCAPSE - Les conditions climatiques actuelles sont très favorables à l'activité de cet insecte alors que le traitement exécuté durant la période du 19 au 21 Juin perd progressivement de son efficacité.

En conséquence, il sera nécessaire d'effectuer une nouvelle application insecticide contre le carpocapse dès le 4 ou 5 Juillet.

Nota - L'adjonction d'un fongicide à la bouillie destinée à combattre le carpocapse ne se justifie actuellement que pour les vergers où des taches de tavelure seraient apparues et pour ceux où un anticryptogamique contre les maladies de conservation n'aurait pas été appliqué lors du traitement effectué selon les indications de notre dernier avis en date du 18 Juin.

## INFORMATIONS

### HARICOT

ANTHRACNOSE - Cette maladie, qui se manifeste sous forme de taches sur tiges, feuilles et gousses, se développe rapidement lors des étés pluvieux. C'est ainsi qu'en 1968 elle a occasionné des pertes de récolte importantes dans les cultures de variétés sensibles.

Les traitements contre cette affection doivent être préventifs. La première application doit se situer au plus tard au stade bouton floral et la seconde, au début de la formation des filets. Les interventions ultérieures seront évidemment fonction de la pluviométrie.

P.1284

Plusieurs fongicides de synthèse, notamment le Mancozèbe et le Thirame à la dose de 2,5 kg à 3 kg de matière active à l'hectare, font preuve d'efficacité contre l'Anthracnose du haricot.

#### ECHALOTE ET OIGNON

MILDIOU - Renouveler la protection de ces cultures.

SELECTION SANITAIRE DES PIEDS-MERES ET PORTE-GRAINES - Nous sommes maintenant dans la période la plus favorable pour éliminer les plants atteints de Bigarrure, chétifs ou d'aspect douteux, pour ne conserver que les plantes saines et de bonne vigueur.

#### POIREAU - GLAIEUL

THRIPS - Les thrips sont de petits insectes de forme très allongée qui piquent les feuilles. Celles-ci prennent alors une teinte argentée par zones plus ou moins étendues. La végétation peut être très ralentie.

Ces insectes s'attaquent également aux fleurs des glaïeuls lesquelles avortent, s'épanouissent irrégulièrement ou se trouvent dépréciées par de nombreuses taches blanchâtres.

Il convient donc d'examiner régulièrement ces plantes et, si nécessaire de traiter avec un insecticide organo-phosphoré (Parathion, Diazinon, Malathion etc...). Sur glaïeul, il importe d'intervenir avant floraison.

L'Ingénieur chargé des Avertissements  
Agricoles,

G. PAITIER.

L'Inspecteur de la Protection  
des Végétaux,

J. DELOUSTAL.